

신체장식 및 미용술

왁싱/제모

보건상 어떤 위험이 있나?

서비스 제공자와 고객이 HIV(인체 면역결핍 바이러스), B형 간염, C형 간염, 또는 세균, 진균 등의 미생물에 노출될 위험이 있습니다.

장비 또는 표면에 피나 체액이 묻지 않았다고 해서 감염 위험이 없는 것이 아닙니다.

시술을 시작하기 전에:

- 물비누를 사용하여 흐르는 온수에 양손을 20 초 이상 씻은 후, 일회용 종이 수건으로 닦으십시오. 손씻기 포스터를 참고하십시오.
- 장갑을 착용할지라도 손을 씻으십시오.
- 시술할 부위 및 그 주위에 생채기, 상처, 발진 또는 눈에 띄는 감염이 있는지 검사하십시오.

시술이 끝난 후에:

- 물비누를 사용하여 흐르는 온수에 양손을 20 초 이상 씻은 후, 일회용 종이 수건으로 닦으십시오(장갑을 착용하고 시술했더라도 씻어야 함).
- 각 고객에 대한 시술이 끝날 때마다, 피부에 왁스를 바르는 데 사용한 개별 카트리지를 폐기하십시오. 또는, 어플리케이터의 롤이 고객의 피부와 직접 접촉하지 않도록, 왁스를 일회용 스트립에 묻힐 수도 있습니다.
- 각 고객에 대한 시술이 끝날 때마다 스투드, 어플리케이터 스트립 등의 일회용 물품을 폐기하십시오.
- 쪽집게, 가위, 눈썹 브러시 등의 기구/장비를 세척*한 후, 70% 이소프로필 알코올 등의 중간 수준소독제로 소독하십시오. 기구를 소독제에 10분간 담가 놓으십시오.
- 오염 예방을 위해, 세척 및 소독한 물품을 청결한 서랍이나 뚜껑 있는 용기에 보관하십시오.
- 작업 표면을 세척*한 후, 표백제 1차술, 물 10컵의 비율로 배합한 표백액 등의 낮은 수준 소독제를 묻혀 10분간 소독하십시오.

*상세한 세척 및 소독 절차는 '일반 지침 및 운영 지침' 설명서를 참고하십시오.

추가적 주의 사항:

- 가열된 왁스는 해로운 미생물을 죽일 만큼 뜨겁지 않습니다. 왁스를 덜 때에는 새 일회용 주걱을 사용하십시오.
- 주걱 하나로 한 번만 더십시오. 두 번 이상 사용하면 감염을 유발할 수 있습니다.
- 모발 제거 시술에 사용한 왁싱 및 슈거링 제품을 재사용 또는 재활용하지 마십시오.
- 인그로운 모발을 제거할 때 쪽집게 및 재사용 가능한 랜셋을 사용하지 마십시오. 소독된 바늘/랜셋을 사용하여 인그로운 모발을 노출시키십시오.
- 주의: 바늘/랜셋을 재사용하지 마십시오(동일 고객에 대해서도 마찬가지임).

자료 출처: The Ministry of Health and long Term Care, Infection Prevention and control Best Practices for Personal Services Settings, January, 2009.

2010 년 10 월