

Inmunizaciones escolares de rutina

Salud Pública de Peel está proporcionando vacunas escolares de rutina a los alumnos de 7° grado y mayores que reúnan los requisitos en clínicas escolares y comunitarias. Las vacunas ofrecidas son **Meningococcal-C-ACYW** (Meningococo-C-ACYW), **Hepatitis B (Hep B)** y **Human Papillomavirus (HPV)** (Virus del Papiloma Humano (VPH)).

Todas estas vacunas son gratuitas para los estudiantes. Algunas vacunas se financian con fondos públicos por un tiempo limitado, y el estudiante sólo puede ser elegible hasta una cierta edad. Los estudiantes pueden vacunarse aunque no tengan la Tarjeta de Salud de Ontario.



La **enfermedad meningocócica** es una infección causada generalmente por cinco grupos diferentes de bacterias que infectan la sangre o el líquido que rodea al cerebro y a la médula espinal. Es una enfermedad rara, pero los síntomas pueden poner en peligro la vida muy rápidamente. Las complicaciones de la enfermedad pueden provocar daño cerebral, pérdida permanente de la audición, convulsiones, amputación de un miembro o la muerte.

Se propaga mediante contacto directo con la saliva o con las mucosidades de una persona infectada, lo que puede ocurrir al besarse, compartir bebidas, utensilios o cepillos de dientes, etc.

La vacuna Men-C-ACYW (Nimenrix®, Menactra®, Menveo™) ofrece protección contra cuatro grupos de bacterias que causan la infección. La vacuna es segura y tiene una eficacia del 80-85%.

En Ontario se exige una dosis única de la vacuna para asistir a la escuela a menos que el estudiante tenga una exención válida. La vacuna Men-C-ACYW se recomienda a todos los adolescentes, incluso si es que fueron vacunados previamente cuando eran bebés o niños pequeños.



La **hepatitis B** es un virus muy contagioso que ataca al hígado y puede causar enfermedad hepática y cáncer de hígado. No tiene cura. La mayoría de las personas infectadas por personas mejoran, pero otras seguirán infectadas y llevarán el virus en su cuerpo el resto de su vida.

Se propaga mediante contacto directo con la sangre o con los fluidos corporales de una persona infectada, incluso si no parece o no se siente enferma. Puede propagarse al compartir máquinas de afeitar, agujas o cepillos de dientes; por tener relaciones sexuales sin protección; y equipos para tatuajes o de spa mal limpiados.

La vacuna de la Hepatitis B (Recombivax HB® o Engerix®-B) es segura y tiene una eficacia superior al 95% cuando se administran todas las dosis.

Los estudiantes de 11 a 15 años necesitan 2 dosis, administradas con un intervalo de 6 meses. Los estudiantes con un sistema inmunológico débil, o los mayores de 16 años necesitarán una tercera dosis.

El **virus del papiloma humano** es un virus muy común que puede causar cáncer de boca, cabeza y cuello, cuello uterino y genitales. Muchas personas no saben que están infectadas y nunca desarrollan síntomas, por lo que pueden contagiar a otros sin saberlo. No hay cura, y sin inmunización, se calcula que 3 de cada 4 canadienses sexualmente activos contraerán el VPH a lo largo de su vida.

Se propaga mediante contacto de piel a piel en la zona genital o durante las relaciones sexuales. La mejor forma de prevenir la infección por VPH es vacunarse antes de mantener relaciones sexuales por primera vez.

La vacuna HPV-9 (Gardasil®-9) es segura y tiene una eficacia superior al 95% cuando se administran todas las dosis. Previene la infección contra siete tipos de virus que pueden provocar cáncer y dos tipos que causan verrugas genitales.

Los estudiantes menores de 15 años necesitan 2 dosis, administradas con 6 meses de intervalo. Los estudiantes con un sistema inmunológico débil o los mayores de 15 años necesitarán una tercera dosis.



¿Qué puede ocurrir luego de recibir la(s) vacuna(s)?

- La mayoría de las personas no tienen problemas después de vacunarse. Algunas pueden tener dolor en el brazo o enrojecimiento, hinchazón o picor en la zona de la aguja.
- Ocasionalmente, puede sentir cansancio, dolor de cabeza, mareos, desmayos, náuseas y una fiebre leve.



¿Cuándo debe llamar a su médico?

- Las reacciones alérgicas y graves tras la vacunación son muy poco frecuentes. Los efectos secundarios pueden aparecer aproximadamente una semana después de la vacunación.
- Póngase en contacto con su médico y con Salud Pública de Peel, llamando al 905-799-7700 si experimenta alguno de los síntomas que se indican a continuación. Si sus síntomas son graves, llame al 911.
 - dificultad para respirar
 - hinchazón de la cara o de la boca
 - urticaria
 - color muy pálido o somnolencia
 - convulsiones
 - fiebre superior a 40 °C

Para mayor información, visite peelregion.ca/immunize o llame a Salud Pública de Peel alv **905-799-7700**.

